

โรคที่มักพบในลูกกระรอก

ลูกกระรอกร่างกายยังไม่แข็งแรงโดยเฉพาะลูกกระรอกที่ยังไม่หย่านมและไม่ได้รับนมจากแม่อย่างเพียงพอ จึงมักจะป่วยด้วยโรคหวัดหรือท้องเสียแบบติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ อีกทั้งกระรอกที่มาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงอาจมีการติดเชื้อต่างๆมากกว่าร้าน เมื่อได้รับลูกกระรอกมาควรนำไปตรวจสุขภาพเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้รักษาอย่างทันที่

โรคหวัด

เป็นหนึ่งในโรคยอดนิยม และเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกกระรอกจากไปอย่างรวดเร็ว อาจเกิดจากติดมาจากร้าน หรือเกิดจากไม่ได้รับความอบอุ่นเพียงพอ อาการมีน้ำมูก หายใจมีเสียงแปลก

เมื่อน้องเป็นหวัด

1. ให้อยู่ในที่อบอุ่น ทาอะไรบังกั้นลมไว้
2. ถ้าน้องกินผลไม้ได้ ให้ทานผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆ เช่นฝรั่ง ส้ม (ห้ามให้ส้มถ้ามีอาการท้องเสียร่วมด้วย)
3. ใช้กระดาษทิชชูเช็ดน้ำมูก หรือใช้ที่ดูดน้ำมูกเด็กดูดน้ำมูก(แต่น้องจะไม่ชอบ และอย่าทำบ่อย เดียวน้องเจ็บ)
4. อาจเสริมวิตามินด้วยวิตามินชนิดน้ำสำหรับเด็ก
5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือแยลง ควรรีบพาไปหาหมอ อาจเป็นปอดชื้นหรือปอดบวมได้

ท้องเสีย

มักเกิดจากอาหาร อาจขนนมข้นไป หรือน้องแพ้นมที่กินอยู่ ถ้าถ่ายมีสีอ่อน หรือถ่ายนิ่มๆ โดยไม่มีกลิ่นแปลกๆ ให้ปรับเรื่องอาหาร หากน้องถ่ายเหลว หรือมีกลิ่นเหม็นคาว อาจเกิดจากการติดเชื้อให้รีบพาไปหาหมอ

เมื่อน้องท้องเสีย

1. งดอาหารอื่นๆ ให้ดื่มเกลือแร่สำหรับเด็กที่ขงเจือจางกว่าปกติ ป้องกันการขาดน้ำ
2. ถ้าน้องยอมทานอาหาร ให้ผสมกล้วยน้ำว้าบด(ใช้ช้อนชูดเอาก็ได้)ลงในนมพอประมาณ หรือถ้าน้องทานเองได้ ให้น้องทานกล้วย งดผลไม้อื่นๆ
3. ถ้าน้องไม่ยอมทานอาหาร ให้พยายามป้อนน้ำผึ้ง(ผสมน้ำหรือนม) หรือน้ำหวาน(ผสมน้ำหรือนม) ป้องกันไม่ให้ท้องช็อกจากการเสียน้ำและหมดแรง
4. ถ้าไม่ดีขึ้น ควรไปหาหมอ ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน ไม่ควรรีให้กินโยเกิร์ต หรือยาคลุกเพราะอาจทำให้อาการแยลง

ถ้าจะเลี้ยงกระรอก เธอรับได้หรือเปล่า ?

- ♥ ถ้ากระรอกโตแล้วไม่เชื่อง
- ♥ ถ้าเล็บกระรอกข่วนจนแขนลาย
- ♥ ถ้ากระรอกกัดจนเป็นแผล เลือดไหล
- ♥ ถ้ากระรอกแทะข้าวของเสียหาย
- ♥ ถ้ากระรอกทำบ้านและทออะ มีกลิ่นเหม็น
- ♥ ถ้ากระรอกฉี่รด
- ♥ ถ้าจะต้องจ่ายค่ารักษาแพงๆ
- ♥ ถ้าต้องใช้เวลาวางเกือบทั้งหมดดูแลกระรอก

การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับการมีลูก ต้องมีเวลา และมีความพร้อมทุกด้าน ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ พრაกเขามาจากอิสราฟอย่างทั้งขวางเขา

ความเข้าใจผิดๆ

- กระรอกไม่ลืมนตาเชื่องกว่า ไม่จริงเพราะขึ้นอยู่กับการดูแล ความใกล้ชิด และนิสัยของกระรอกแต่ละตัว
- เลี้ยงกระรอกด้วยซิลิแลคเท่านั้น ซิลิแลคไม่เหมาะกับการเลี้ยงกระรอก เพราะมีแป้งเยอะ และมีสารอาหารไม่เพียงพอ
- กระรอกท้องเสียให้กินยาคลุกท์ คุณหมอ ไม่แนะนำเนื่องจากอาจทำให้อาการยิ่งแยลง
- กระรอกป่วยแต่ดูแลแข็งแรงดีคงไม่เป็นไรมาก ไม่จริงเลย กระรอกป่วยมักจากไปอย่างเฉียบพลัน และไม่คอยแสดงอาการเชิงซึม หากกระรอกเริ่มผิดปกติควรรีบพาไปหาหมอ เพื่อรักษาได้ทันที่

คำแนะนำ ในเอกสารนี้ เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม website : <http://www.ma-tang.com> fanpage : <http://www.facebook.com/baanmatang>

คู่มือ

การดูแลลูกกระรอก

ฉบับย่อ



อย่างไรก็ตามเรา **ไม่สนับสนุน** ให้เลี้ยงกระรอกที่ยังไม่ลืมนตาเพราะมีโอกาสรอดน้อยมาก และไม่สนับสนุนผู้ค้ากระรอกที่ทรมาณกระรอกด้วยการตัดฟัน ทำร้าย หรือมอมยากระรอก

จัดทำโดย ma-tang.com © 2011 บ้านมะ-แดง

ด้วยความเอื้อเฟื้อข้อมูลของเพื่อนสมาชิกทุกท่าน อนุญาตให้ทำซ้ำหรือแจกจ่ายโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ



รู้จักกระรอก

ลักษณะทั่วไป

กระรอก เป็นสัตว์จำพวกฟันกัดแทะ เช่นเดียวกับ หนู กระต่าย ซึ่งมีฟันคู่หน้าใหญ่และแข็งแรงสำหรับกัดแทะ กระรอก มีหลากหลายสายพันธุ์ และอาจแบ่งได้เป็น 3 พวกใหญ่ๆ ได้แก่ กระรอกต้นไม้ กระรอกดิน และ กระรอกบิน กระรอกมีขนหางยาวเป็นพวงฟูสวยงาม



กระรอก กับ กระแต เป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์ แต่บางครั้งชาวบ้านก็เรียกกระจ้อนหรือกระรอกดินข้างล่างว่ากระแตด้วย
 กระรอกบิน กับ จิงโจ้บิน(ซูการี) ไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวกัน แต่มีพังผืดข้างลำตัวสำหรับกางเพื่อร่อนไปมาได้เหมือนกัน
 กระรอกบิน กับ บ่าง ก็ไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวกัน ลักษณะของพังผืดก็แตกต่างกันด้วย

(บน) กระแต (กลาง) กระจ้อน (ล่างจากซ้าย) บ่าง ซูการีไกลเดอร์ กระรอกบิน



อาหาร

อาหารของกระรอกในธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกไม้ ลูกไม้ ผลไม้ เมล็ดต่างๆ แมลง ไช้หนก หรือสัตว์ตัวเล็กๆ เป็นต้น

พฤติกรรม

โดยทั่วไปแล้วกระรอกจะหากินบนต้นไม้ตามเรือนยอดระดับต่างๆ เว้นกระรอกดินซึ่งมักหากินบนพื้นดิน หรือต้นไม้เตี้ยๆ เท่านั้น กระรอกส่วนใหญ่หากินในเวลาเช้ามืด และ เย็นๆ ส่วนกระรอกบินนั้นมักหากินในเวลากลางวัน กระรอกชอบแทะทำลายอยู่เสมอเพื่อลับฟันหน้าที่งอกออกมาตลอดเวลา กระรอกรักสันโดษมักอยู่ลำพังหรือเป็นคู่ และห้วงถิ่นที่อยู่

การผสมพันธุ์

กระรอกมีฤดูผสมพันธุ์ปีละสองครั้ง ตัวเมียตั้งท้องประมาณ 40-45 วัน แล้วแต่สายพันธุ์ ตกไข่ครั้งละ 1-2 ตัว

พัฒนาการของลูกกระรอก

ในภาพเป็นกระรอกของต่างประเทศขนาดตัวจะใหญ่กว่ากระรอกบ้านเรา

	อายุ 0-2 สัปดาห์ ช่วงนี้ท้องกระรอกจะตัวแดงๆ จนถึงเริ่มไม่แดง
	อายุ 2-3 สัปดาห์ จะเริ่มเห็นสีของผิวหนังซึ่งจะเป็นบริเวณที่ ขนจะขึ้นเป็นลาย
	อายุ 3-4 สัปดาห์ เริ่มมีขึ้นเป็นสีขุ่นบริเวณที่เป็นลายของผิวหนังในตอนแรก
	อายุ 5-6 สัปดาห์ ขนจะเริ่มปกคลุม ทั้งลำตัวและเท้า และตาจะเริ่มจะเปิด
	อายุ 10 สัปดาห์ขึ้นไป จะกินอาหารอื่นได้บ้างแล้ว นอกจากนม แต่ก็ยังต้องให้นมเสริม
	อายุ 5 เดือน ท้องกระรอกก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วจ้า

เรียบเรียงจาก : <http://www.geocities.com/squirrelcare/age.html>

การดูแลของกระรอก



ท้องกระรอกตัวผู้จะมีแท่งยาวๆ และมีไข่เล็กๆ (ที่อีกหน่อยจะใหญ่มาก) ถัดไปจึงจะเป็นรูทวาร

ส่วนท้องกระรอกตัวเมียมีจุ่มจุ่มเล็กๆใกล้กับรูทวารเลย

ตัวเมีย

ตัวผู้

การดูแลและการให้นม

นมวัวทั่วไปเป็นอันตรายต่อลูกกระรอก

ลูกกระรอกไม่สามารถย่อยนมวัวได้ ซึ่งมักจะทำให้ลูกกระรอกท้องเสียอาจถึงตายได้ ควรใช้นมสำหรับลูกแมว หรือลูกสุนัข เช่น Esbilac KMR และอาจใช้นมแพะแทนได้

ซิลิแลคไม่เหมาะใช้เป็นนมทดแทน

ลูกกระรอกแรกเกิดต้องการสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ซึ่งซิลิแลคมีส่วนประกอบที่เป็นแป้งมากเกินไปจนทำให้ลูกกระรอกย่อยอาหารไม่ค่อยดีและอาจท้องเสียได้

การชงนม

หากใช้นมที่ตองซง ในลูกกระรอกที่ยังไม่มีลมตาอาจใช้อัตราส่วน น้ำร้อน : นมผง 1:1 ในลูกกระรอกที่ลมตาแล้ว อาจใช้อัตราส่วน 1:2 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนนมควรผสมนมชนิดใหม่กับนมชนิดเดิมในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยป้องกันการท้องเสีย

การให้นม

ควรใช้หลอดหยด หรือหลอดฉีดขนาด 1cc เพื่อควบคุมปริมาณให้นมได้ง่าย ค่อยๆบีบให้นมไหลออกทีละน้อย และน้องกระรอกเลียกิน อย่ารีบลูกกระรอกจะสำลัก หรือมีน้ำนมเข้าจมูก ทำให้เป็นหวัดหรืออาจเข้าปอดเป็นปอดบวมได้ อาจใช้ผ้าห่อตัวกระรอกไว้ในขณะป้อนด้วย ลูกกระรอกแรกเกิดจะต้องเลี้ยงดูเหมือนเด็กทารก ต้องกินนมบ่อยครั้งในปริมาณไม่มาก และได้รับความปลอดภัย อาจต้องกกไฟด้วยหากอากาศเย็น

ความถี่ในการให้นม

อายุ	มื้อ/วัน	ความถี่	ประเภทอาหาร
0-2 สัปดาห์	6-8	ทุกๆ 2-2.5 ชม. + 1 ครั้ง กลางคืน	นม
3-4 สัปดาห์	6	ทุกๆ 3-4 ชม. + 1 ครั้ง กลางคืน	นม
4-5 สัปดาห์	5	ทุกๆ 4-5 ชม. + 1 ครั้ง กลางคืน(แล้วแต่)	นม
5-6 สัปดาห์	5	ทุกๆ 4-5 ชม.	นม และ ผลไม้
7-8 สัปดาห์	4	ทุกๆ 5 ชม.	นม และ ผลไม้
9-10สัปดาห์	1-2	เช้า เย็น	นม และ ผลไม้

เช็ดกระตุ้นให้ลูกกระรอกขับถ่าย

กระรอกที่ยังไม่มีลมตาหลังอาหารสักครู่ควรใช้สำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆ เช็ดเบาๆ ที่รูทวารและอวัยวะเพศ เพื่อกระตุ้นให้ท้องฉี่ อี เหมือนที่แม่กระรอกทำ แล้วอย่าลืมเช็ดให้ตัวน้องแห้งอยู่เสมอ

เปลี่ยนผ้ารองรองบ่อยๆ

คอยดูแลให้ผ้ารองที่นอนลูกกระรอกแห้งอยู่เสมอป้องกันน้องกระรอกเป็นหวัด